

**Informovaný souhlas rodiče (či zákonného zástupce) dítěte
s léčbou alergickou imunoterapií**

Vážená paní, vážený pane,

odborný lékař doporučil Vašemu dítěti léčbu nazývanou alergická imunoterapie (jiné názvy, se kterými se můžete setkat – alergická vakcinace, hyposenzibilizace, desenzibilizace). Léčba spočívá v podávání přesně stanovených dávek alergenu, na který je Vaše dítě přecitlivělé, v přesně stanovených časových intervalech. Alergen je podáván podkožně, aplikace je téměř nebolestivá. V úvodní fázi léčby se zvyšuje dávka a koncentrace alergenu až do dávky udržovací, která je pak opakovaně podávána v delších časových intervalech alespoň další 3 roky, což je minimální doba nutná k dosažení léčebného účinku. Léčebný alergen je upraven tak, aby u nevyvolával žádné obtíže, naopak, úspěšná léčba vede obvykle již po prvním roce ke zmírnění alergických příznaků.

Vzhledem k tomu, že se jedná o látku, na kterou je Vaše dítě alergické, nelze však ani při správném postupu zcela vyloučit vyvolání nežádoucí reakce. Většinou je jen mírné intenzity a není důvodem k ukončení dlouhodobé léčby. Reakce může vzniknout časně po aplikaci dávky vakcíny (časná reakce) nebo s odstupem několika hodin (pozdní reakce, obvykle pouze místní zduření a bolestivost v místě vpichu).

Je proto vhodné, abyste dítě k aplikaci imunoterapie doprovázel/a a pozorně sledoval/a jeho zdravotní stav.

Pro bezpečnost průběhu léčby je nezbytné dodržovat následující pokyny lékaře a zdravotní sestry

1. Před podáním injekčního alergenu je nutné oznámit:

- případnou pozdní reakci po předchozím inj. podání alergenu (výraznou a přetrvávající reakci v místě podání alergenu, zhoršení nebo nový vznik alergických obtíží u Vašeho dítěte),
- jakoukoli změnu zdravotního stavu dítěte, i když nesouvisí s vlastním alergickým onemocněním (infekční onemocnění, nově vzniklé zdravotní obtíže, nově užívané léky),
- plánovaná nebo aplikovaná očkování.

2. Po podání injekčního alergenu je nezbytné nutné, aby Vaše dítě setrvalo 30 minut v klidu pod lékařským dohledem. Případné obtíže (svědění pokožky, kopřivka, kýchání, vodnatá rýma, svědění spojivky, kašel, dušnost, pocit slabosti apod.) je nutné neprodleně ohlásit zdravotní sestře.

V den podání injekčního alergenu se dítě musí vyvarovat výraznější fyzické zátěže, cvičení, sprchování horkou vodou a kontaktu s alergenem.

Pro úspěšný průběh léčby doporučujeme dodržovat lékařem stanovené intervaly podání alergenu. V případě odkladu plánovaného termínu (např. pro akutní onemocnění) se domluvíte o dalším postupu s ošetřujícím lékařem.

Potvrzuji, že jsem byl(a) odborným lékařem..... seznámen(a) se zásadami alergické imunoterapie u mého dítěte a byl(a) jsem upozorněn(a) na možná rizika, která jsou s léčbou spojena. Se způsobem léčby souhlasím.

Dne: _____ Podpis rodiče (či zákonného zástupce) dítěte: _____