


Praktické aspekty alergenové imunoterapie STALORALEM (celoroční alergeny)

SLIT: APLIKACE (NOVÁ LAHVIČKA)



SLIT: APLIKACE (JEDNOTLIVÁ DÁVKA)



Připravit pumpičku k použití opak. stisknutím dávkovače („vidím kapku“).

Vložit náustek do úst, za zuby a pod jazyk.

Jemně stisknout dávkovač tolikrát, aby bylo dosaženo celkové denní dávky.

Přípravek nechat pod jazykem min. 2 minuty.
Pak polknout.

Přípravek aplikovat denně (nejlépe ve stejnou dobu - „rutina“).
Je třeba mít čistou ústní sliznici (prázdná ústa, nejíst a nepít ještě min. 5 minut před/po aplikaci, odstup od čištění zubů 15 min.).

SLIT: APLIKACE (SKLADOVÁNÍ)



- Mimo dosah a dohled dětí.
- Chraň před teplem i mrazem !!** Uchovávej v teplotě 2 až 8 st.C (chladnička).
- Na cestách lahvičku s nasazenou pumpičkou přenášeš ve svislé poloze a v letadle v příručním zavazadle
- Respektuj datum expirace na lahvičce** (platí pro neotevřené lahvičky). Otevřená lahvička má dobu použitelnosti 1 měsíc.

SLIT TBL.: RIZIKA - NEŽ. REAKCE



Obvyklé (lokální)

- orální syndrom** .. svědění či jiné dráždění až otok v ústech, na rtech či hrdle, orofaryngeální

Tyto nežádoucí reakce jsou typicky jen mírné, trvají krátce a na počátku léčby, v čase spontánně ustupují a nejsou tak obvykle důvodem k přerušení SLIT. Jsou důkazem přirozené reakce organismu na zvolený alergen a správně indikované léčby.

Méně obvyklé (nelokální)

- dyspeptické potíže .. nevolnost, regurgitace, pálení žáhy, zvracení, průjem, břišní dyskomfort
- projevy rýmy či dráždění očí po podání, zhoršení astmatu
- celkové kožní reakce (kopřivka, angioedém)

Vzácné – anafylaxe (šoková reakce, jiné závažné reakce)

SLIT TBL.: POSTUP - NEŽ. REAKCE



Při nežádoucích reakcích:

- nepodávej další dávku, pokud nežádoucí reakce trvá** (aplikuj další dávku až den po skončení reakce)
- další dávku podej event. sníženou** („na polovinu“, resp. podle konzultace s lékařem)
- užij, je-li potřeba, lék potlačující nežádoucí reakci** (antihistaminikum, event. oční, nosní či inhalační lék, event. léky tzv. pohotovostního setu /tbl. kortikoid, adrenalin/). **V případě těžší reakce vyhledej lékařskou pomoc** (v případě anafylaktické - šokové reakce volej ihned RZP).
- při nečekaných nežádoucích reakcích** (mimo „obvyklé“ orální projevy) informuj svého alergologa
- při nerizikových lokálních reakcích se pokus aplikovat pomocná opatření**



Jídlo a pití 5-15 minut po užití SLIT tablety může zmírnit příznaky



Sklenice studené vody po podání a rozpuštění SLIT tablety

Posuď odezvu na nepolknutí, ale vyplivnutí silného depa s alergenem (po požadované 2 minutové inkubaci).



Kostka ledu položená pod jazyk přibližně 5 minut po užití SLIT tablety



Před užitím SLIT tablety se může zvážit použití antihistaminik

SLIT: RIZIKA - PREVENCE



Zastavení aplikace

- nastanou-li kontraindikace .. nejčastěji:
 - autoimunity /revm.onem., celiakie/ a malignity
 - chronické onemocnění ústní dutiny
 - obtížně kontrolovatelné astma
- při non-compliance pacienta
- není –li dosaženo léčebného efektu
- po anafylaktické (šokové) reakci, resp. i po jiné opakované závažné nežádoucí reakci

SLIT: RIZIKA - PREVENCE



Přerušeni aplikace

- Záněty a poškození ústní sliznice (infekce /moučnicka/, afty, stomatologické zákroky, vypadnutí /mléčného/ zubu)
 - po dobu trvání, resp. do zhojení rány
- Poruchy polykání a bolesti na hrudi
 - dle posouzení alergologem
- Při nežádoucích příznacích léčby Staloralem
 - po dobu trvání, resp. dle posouzení alergologem
- Horečka a akutní infekce
 - po dobu trvání akutní fáze infekce
- Exacerbace astmatu
 - po dobu trvání zhoršení astmatu

SLIT: RIZIKA - PREVENCE




Informovat lékaře:

- Při delším přerušeni léčby (nad 1 týden až měsíc)
 - Při nečekaných nežádoucích reakcích léčby
 - Při poruchách polykání a bolesti na hrudi
 - Při závažné změně zdravotního stavu (nové onemocnění)
 - Při zhoršení základního alergického onemocnění
 - Při zahájení léčby beta blokátory (antihypertenziva)
 - Při těhotenství
- Dbej na dostatečnou zásobu léku !!!**
- nejpozději při otevření posledního balení (krabičky s dvěma lahvičkami) je nutno objednat další zásobu léku (dvě až čtyři balení).

SLIT: DÁVKOVÁNÍ (ROZTOČI)

× Iničiální fáze

.. 9 dnů



× Udržovací fáze

.. dalších 3 až 5 let

obvykle
(2)-4 kapky denně
(celoročně)

SLIT: DÁVKOVÁNÍ (KOČKA, PES)

× Iničiální fáze

.. 10 dnů



× Udržovací fáze

.. dalších 3 až 5 let

obvykle
5 dávek denně
(celoročně)

SLIT: REDUKCE DÁVEK



A. při přerušeni aplikace v iničiální fázi:

- začni znovu od 1 kapka 10 IR/ml „modrá“

B. při přerušeni aplikace v udržovací fázi:

- přerušeni do 1 týdne:
 - pokračuj poslední dávkou 300 IR/ml „fialová“
- přerušeni do 1 měsíce:
 - začni znovu od 1 kapka 10 IR/ml „modrá“, event. po poradě od 1 kapka 300 IR/ml „fialová“
- přerušeni nad 1 měsíc:
 - konzultuj svého alergologa (sám nepokračuj)