

## Praktické aspekty alergenové imunoterapie STALORALEM 300

### SLIT: APLIKACE (NOVÁ LAHVIČKA)

- 1 Sundat plastické víčko
- 2 Zatáhnout za kovové ouško a sundat hliníkový uzávěr
- 3 Odstranit pryžovou zátku
- 4 Vymout dávkovací pumpičku z obalu. Postavit lahvičku na rovný povrch a opatrně nasadit pumpičku
- 5 Sejmout oranžový bezpečnostní kroužek.
- 6 Připravit dávkovací pumpičku k použití opakovaným stisknutím dávkovače.
- 7 Vložit náustek do úst pod jazyk. Jemně stisknout dávkovač tolikrát, aby bylo dosaženo celkové denní dávky. **Přípravek nechat pod jazykem 2 minuty.**
- 8 Náustek po použití očistit a znovu nasadit ochranný kroužek.

### SLIT: APLIKACE (JEDNOTLIVÁ DÁVKA)



Připravit pumpičku k použití opak. stisknutím dávkovače („vidím kapku“).

**Vložit náustek do úst, za zuby a pod jazyk.**

Jemně stisknout dávkovač tolikrát, aby bylo dosaženo celkové denní dávky.

**Přípravek nechat pod jazykem min. 2 minuty.**  
Pak polknout.

**Přípravek aplikovat denně** (nejlépe ve stejnou dobu - „rutina“).  
**Je třeba mít čistou ústní sliznici** (prázdná ústa, nejíst a nepít ještě min. 5 minut po aplikaci).

### SLIT: APLIKACE (SKLADOVÁNÍ)



- Mimo dosah a dohled dětí.
- **Chraň před teplem i mrazem !!** Uchovávej v teplotě 2 až 8 st.C (chladnička).
- Na cestách lahvičku s nasazenou pumpičkou přenášeš ve svislé poloze a v letadle v příručním zavazadle
- **Respektuj datum expirace na lahvičce** (platí pro neotevřené lahvičky). Otevřená lahvička má dobu použitelnosti 1 měsíc.

### SLIT: RIZIKA - NEŽ. REAKCE



#### • Obvyklé

- > **orální syndrom** .. svědění či jiné dráždění až otok v ústech, na rtech či hrdle, orofaryngeální dyskomfort

**Tyto nežádoucí reakce jsou typicky jen mimé a na počátku léčby**, v čase spontánně ustupují a nejsou tak obvykle důvodem k přerušení SLIT.

#### • Méně obvyklé

- > dyspeptické potíže .. nevolnost, regurgitace, pálení žáhy, zvracení, průjem, břišní dyskomfort
- > projevy rýmy či dráždění očí po podání, zhoršení astmatu
- > celkové kožní reakce (kopřivka, angioedém)

#### • Vzácné – anafylaxe (šoková reakce, jiné závažné reakce)

### SLIT: RIZIKA - PREVENCE



#### **Zastavení aplikace**

- **nastanou-li kontraindikace .. nejčastěji:**
  - > autoimunity /revm.onem., celiakie/ a malignity
  - > chronické onemocnění ústní dutiny
  - > obtížně kontrolovatelné astma
- **při non-compliance pacienta**
- **není –li dosaženo léčebného efektu**
- **po anafylaktické (šokové) reakci, resp. i po jiné opakované závažné nežádoucí reakci**


## SLIT: RIZIKA - PREVENCE



### Přerušeni aplikace

- Záněty a poškození ústní sliznice (infekce /moučivka/, afty, stomatologické zákroky, vypadnutí /mléčného/ zubu)
  - po dobu trvání, resp. do zhojení rány
- Poruchy polykání a bolesti na hrudi
  - dle posouzení alergologem
- Při nežádoucích příznacích léčby Staloralem
  - po dobu trvání, resp. dle posouzení alergologem
- Horečka a akutní infekce
  - po dobu trvání akutní fáze infekce
- Exacerbace astmatu
  - po dobu trvání zhoršení astmatu

## SLIT: RIZIKA - PREVENCE



### Informovat lékaře:

- **Při delším přerušeni léčby (nad ½- 1 měsíc)**
  - **Při nečekaných nežádoucích reakcích léčby**
  - Při poruchách polykání a bolesti na hrudi
  - Při závažné změně zdravotního stavu (nové onemocnění)
  - Při zhoršení základního alergického onemocnění
  - Při zahájení léčby beta blokátory (antihypertenziva)
  - Při těhotenství
- Dbej na dostatečnou zásobu léku !!!**
- nejpozději při otevření posledního balení (krabičky s dvěma lahvičkami) je nutno objednat další zásobu léku (dvě až čtyři balení).

## SLIT: DÁVKOVÁNÍ (STARÝ DÁVKOVAČ)



### × Iniciální fáze

.. 11 dnů



### × Udržovací fáze

.. dalších 3 až 5 let

8 kapek 3x týdně (celoročně)  
x  
8 kapek denně (do konce sezony)


10 IR/ml (modrá)

300 IR/ml (fialová lahvička)

## SLIT: DÁVKOVÁNÍ (NOVÝ DÁVKOVAČ)

### × Iniciální fáze

.. 9 dnů



### × Udržovací fáze

.. dalších 3 až 5 let

4 kapky 3x týdně (celoročně)  
x  
4 kapky denně (do konce sezony)

10 IR/ml (modrá)

300 IR/ml (fialová lahvička)

## SLIT: REDUKCE DÁVEK




### A. při přerušeni aplikace v iniciální fázi:

- začni znovu od 1 kapka 10 IR/ml „modrá“

### B. při přerušeni aplikace v udržovací fázi:

- **přerušeni do 1 týdne:**
  - pokračuj poslední dávkou 300 IR/ml „fialová“
- **přerušeni do 1 měsíce:**
  - začni znovu od 1 kapka 10 IR/ml „modrá“, event. po poradě od 1 kapka 300 IR/ml „fialová“
- **přerušeni nad 1 měsíc:**
  - konzultuj svého alergologa (sám nepokračuj)

## SLIT: REDUKCE DÁVEK



### C. při nežádoucích reakcích:

1. nepodávej další dávku, pokud nežádoucí reakce trvá (aplikuj další dávku až den po skončení reakce)
2. další dávku podej sníženou (na polovinu, v iniciačním schématu, resp. podle konzultace s lékařem)
3. užij, je-li potřeba, lék potlačující nežádoucí reakci (antihistaminikum, event. oční, nosní či inhalační lék, event. léky tzv. pohotovostního setu /tbl. kortikoid, adrenalin/). **V případě těžší reakce vyhledej lékařskou pomoc** (v případě anafylaktické - šokové reakce volej ihned RZP).
4. **při nečekaných nežádoucích reakcích** (mimo „obvyklé“ orální projevy) **informuj svého alergologa**