

## Praktické aspekty alergenové imunoterapie STALORALEM 300

### SLIT: APLIKACE (NOVÁ LAHVIČKA)

- 1 Sundat plastické víčko
- 2 Zatáhnout za kovové ouško a sundat hliníkový uzávěr
- 3 Odstranit pryžovou zátku
- 4 Vymout dávkovací pumpičku z obalu. Postavit lahvičku na rovný povrch a opatrně nasadit pumpičku
- 5 Sejmout oranžový bezpečnostní kroužek.
- 6 Připravit dávkovací pumpičku k použití opakovaným stisknutím dávkovače.
- 7 Vložit náustek do úst pod jazyk. Jemně stisknout dávkovač tolikrát, aby bylo dosaženo celkové denní dávky. **Přípravek nechat pod jazykem 2 minuty.**
- 8 Náustek po použití očistit a znovu nasadit ochranný kroužek.

### SLIT: APLIKACE (JEDNOTLIVÁ DÁVKA)



Připravit pumpičku k použití opak. stisknutím dávkovače („vidím kapku“).

**Vložit náustek do úst, za zuby a pod jazyk.**

Jemně stisknout dávkovač tolikrát, aby bylo dosaženo celkové denní dávky.

**Přípravek nechat pod jazykem min. 2 minuty.**  
Pak polknout.

**Přípravek aplikovat denně** (nejlépe ve stejnou dobu - „rutina“).  
**Je třeba mít čistou ústní sliznici** (prázdná ústa, nejíst a nepít ještě min. 5 minut před/po aplikaci, odstup od čištění zubů 15 min.).

### SLIT: APLIKACE (SKLADOVÁNÍ)



- Mimo dosah a dohled dětí.
- Chraň před teplem i mrazem !!** Uchovávej v teplotě 2 až 8 st.C (chladnička).
- Na cestách lahvičku s nasazenou pumpičkou přenášej ve svislé poloze a v letadle v příručním zavazadle
- Respektuj datum expirace na lahvičce** (platí pro neotevřené lahvičky). Otevřená lahvička má dobu použitelnosti 1 měsíc.

### SLIT TBL.: RIZIKA – NEŽ. REAKCE

#### Obvyklé (lokální)

- orální syndrom** .. svědění či jiné dráždění až otok v ústech, na rtech či hrdle, orofaryngeální dyskomfort



Tyto nežádoucí reakce jsou typicky jen mírné, trvají krátce a na počátku léčby, v čase spontánně ustupují a nejsou tak obvykle důvodem k přerušení SLIT. Jsou důkazem přirozené reakce organismu na zvolený alergen a správně indikované léčby.

#### Méně obvyklé (nelokální)

- dyspeptické potíže .. nevolnost, regurgitace, pálení žáhy, zvracení, průjem, břišní dyskomfort
- projevy rýmy či dráždění očí po podání, zhoršení astmatu
- celkové kožní reakce (kopřivka, angioedém)

#### Vzácné – anafylaxe (šoková reakce, jiné závažné reakce)

### SLIT TBL.: POSTUP – NEŽ. REAKCE

#### Při nežádoucích reakcích:

- nepodávej další dávku, pokud nežádoucí reakce trvá** (aplikuj další dávku až den po skončení reakce)
- další dávku podej event. sníženou** („na polovinu“, resp. podle konzultace s lékařem)
- užij, je-li potřeba, lék potlačující nežádoucí reakci** (antihistaminikum, event. oční, nosní či inhalační lék, event. léky tzv. pohotovostního setu /tbl. kortikoid, adrenalin/).
- V případě těžší reakce vyhledej lékařskou pomoc** (v případě anafylaktické - šokové reakce volej ihned RZP).
- při nečekaných nežádoucích reakcích** (mimo „obvyklé“ orální projevy) **informuj svého alergologa**
- při nerizikových lokálních reakcích se pokus aplikovat pomocná opatření jako:**

Jídlo a pití 5–15 minut po užití SLIT tablety může zmírnit příznaky

Sklenice studené vody po podání a rozpuštění SLIT tablety

Posuď odezvu na nepoknutí, ale vyplivnutí silného depa s alergenem (po požadované 2 minutové inkubaci).

Kostka ledu položená pod jazyk, přibližně 5 minut po užití SLIT tablety

Před užitím SLIT tablet se může zvážit použití antihistaminik

## SLIT: RIZIKA - PREVENCE



### Zastavení aplikace

- nastanou-li kontraindikace .. nejčastěji:
  - autoimunity / revm.onem., celiakie/ a malignity
  - chronické onemocnění ústní dutiny
  - obtížně kontrolovatelné astma
- při non-compliance pacienta
- není –li dosaženo léčebného efektu
- po anafylaktické (šokové) reakci, resp. i po jiné opakované závažné nežádoucí reakci

## SLIT: RIZIKA - PREVENCE



### Přerušení aplikace

- Záněty a poškození ústní sliznice (infekce /moučivka/, afty, stomatologické zákroky, vypadnutí /mléčného/ zubu)
  - po dobu trvání, resp. do zhojení rány
- Poruchy polykání a bolesti na hrudi
  - dle posouzení alergologem
- Při nežádoucích příznacích léčby Staloralem
  - po dobu trvání, resp. dle posouzení alergologem
- Horečka a akutní infekce
  - po dobu trvání akutní fáze infekce
- Exacerbace astmatu
  - po dobu trvání zhoršení astmatu

## SLIT: RIZIKA - PREVENCE



### Informovat lékaře:

- Při delším přerušení léčby (nad 1 týden až měsíc)
- Při nečekaných nežádoucích reakcích léčby
- Při poruchách polykání a bolesti na hrudi
- Při závažné změně zdravotního stavu (nové onemocnění)
- Při zhoršení základního alergického onemocnění
- Při zahájení léčby beta blokátory (antihypertenziva)
- Při těhotenství


### Dbej na dostatečnou zásobu léku !!!

- nejpozději při otevření posledního balení (krabičky s dvěma lahvičkami) je nutno objednat další zásobu léku (dvě až čtyři balení).

## SLIT: DÁVKOVÁNÍ (ROZTOČI)

### × Iniciální fáze

.. 9 dnů



### × Udržovací fáze


.. dalších 3 až 5 let

obvykle  
4 kapky 3x týdně  
(celoročně)

## SLIT: DÁVKOVÁNÍ (PYL)

### × Iniciální fáze

.. 9 dnů



### × Udržovací fáze

.. dalších 3 až 5 let

obvykle  
4 kapky denně  
(do konce sezony  
vybraného pylu)

## SLIT: REDUKCE DÁVEK



### A. při přerušení aplikace v iniciální fázi:

- začni znovu od 1 kapka 10 IR/ml „modrá“

### B. při přerušení aplikace v udržovací fázi:

- přerušení do 1 týdne:
  - pokračuj poslední dávkou 300 IR/ml „fialová“
- přerušení do 1 měsíce:
  - začni znovu od 1 kapka 10 IR/ml „modrá“, event. po poradě od 1 kapka 300 IR/ml „fialová“
- přerušení nad 1 měsíc:
  - konzultuj svého alergologa (sám nepokračuj)