


Praktické aspekty alergenové imunoterapie tabletovou vakcínou (roztoči – Acarizax, Actair)

SLIT TBL.: APLIKACE (JEDNOTLIVÁ DÁVKA)



Vložit tabletu do úst,
za zuby a pod jazyk.

Tabletu nechat rozplynout do
slin (nepolykat).

Po rozplynutí nechat sliny s vakcínou pod
jazykem ještě min. 2 minuty.

Pak polknout.

Přípravek aplikovat denně (nejlépe ve stejnou dobu - „rutina“).
Je třeba mít čistou a „nepoškozenou“ ústní sliznici
(prázdná a čistá ústa, nejíst a nepít ještě min. 5 minut před/po aplikaci,
odstup od čištění zubů alespoň 15 minut).

SLIT TBL.: APLIKACE (SKLADOVÁNÍ)

- **Nejsou vyžadovány zvláštní podmínky pro uchovávání!!**

.. nicméně: chraňte před mrazem a ponechte mimo dosah a dohled dětí.

- **Respektuj datum expirace na blistru (krabičce).**

SLIT TBL.: RIZIKA – NEŽ. REAKCE

- **Obvyklé (lokální)**

- **orální syndrom** .. svědění či jiné dráždění až otok v ústech, na rtech či hrdle, orofaryngeální dyskomfort



Tyto nežádoucí reakce jsou
typicky jen mírné, trvají krátce a na počátku léčby,
v čase spontánně ustupují a nejsou tak obvykle
důvodem k přerušení SLIT. Jsou důkazem přirozené
reakce organismu na zvolený alergen a správně indikované léčby.

- **Méně obvyklé (nelokální)**

- dyspeptické potíže .. nevolnost, regurgitace, pálení žáhy, zvracení, průjem, břišní dyskomfort
- projevy rýmy či dráždění očí po podání, zhoršení astmatu
- celkové kožní reakce (kopřivka, angioedém)

- **Vzácné** – anafylaxe (šoková reakce, jiné závažné reakce)

SLIT TBL.: POSTUP – NEŽ. REAKCE

Při nežádoucích reakcích:

1. **nepodávej další dávku, pokud nežádoucí reakce trvá** (aplikuj další dávku až den po skončení reakce)
2. **další dávku podej event. sníženou** („na polovinu“, resp. podle konzultace s lékařem)
3. **užij, Je-li potřeba, lék potlačující nežádoucí reakci** (antihistaminikum, event. oční, nosní či inhalační lék, event. léky tzv. pohotovostního setu /tbl. kortikoid, adrenalin/).
V případě těžší reakce vyhledej lékařskou pomoc (v případě anafylaktické-šokové reakce volej ihned RZP).
4. **při nečekaných nežádoucích reakcích** (mimo „obvyklé“ orální projevy) **Informuj svého alergologa**
5. **při nerizikových lokálních reakcích se pokus aplikovat pomocná opatření jako:**



Jídlo a pítí 5–15 minut
po užití SLIT tablety může
zmenšit příznaky



Sklenice studené vody
po podání a rozpuštění
SLIT tablety

Posuď odezvu na nepolknutí,
ale vyplivnutí slinného depra s
alergenem (po požadované 2
minutové inkubaci).



Kostka ledu položená
pod jazyk přiložená 5 minut
po užití SLIT tablety



Před užitím SLIT tablet
se může zvážit použití
antihistaminik

SLIT TBL.: RIZIKA - PREVENCE

Zastavení aplikace

- **nastanou-li kontraindikace .. nejčastěji:**
 - autoimunita /revm.onem., celiakie/ a malignity
 - chronické onemocnění ústní dutiny
 - obtížně kontrolovatelné astma
- **při non-compliance pacienta (časté zapomínání)**
- **není –li dosaženo léčebného efektu**
- **po anafylaktické (šokové) reakci, resp. i po jiné opakované závažné nežádoucí reakci**

SLIT TBL.: RIZIKA - PREVENCE

Přerušeni aplikace

- **Záněty a poškození ústní sliznice** (Infekce /moučivka/, četné afty, stomatologické zákroky, vypadnutí /mléčného/ zubu)
 - > po dobu trvání, resp. do zhojení rány
- Poruchy polykání a bolesti na hrudi
 - > dle posouzení alergologem
- **Při nežádoucích příznacích léčby obecně**
 - > po dobu trvání, resp. dle posouzení alergologem
- **Horečka a akutní infekce**
 - > po dobu trvání akutní fáze infekce
- Exacerbace astmatu
 - > po dobu trvání zhoršení astmatu

SLIT TBL.: RIZIKA - PREVENCE

- Informovat lékaře:
 - > **Při delším přerušeni léčby (nad týden až dva)**
 - > **Při nečekaných nežádoucích reakcích léčby**
 - > Při poruchách polykání a bolesti na hrudi
 - > Při závažné změně zdravotního stavu (nové onemocnění)
 - > Při zhoršení základního alergického onemocnění
 - > Při zahájení léčby beta blokátory (antihypertenziva)
 - > Při těhotenství
- **Dbet na dostatečnou zásobu léku.**
 - > včas si zajisti novy recept.


SLIT: DÁVKOVÁNÍ (ACTAIR)



× Období: celoročně

.. evaluace (dotazník CSMS měsíční + RQLQ) před/při zahájení léčby

.. evaluace (dotazník CSMS měsíční + RQLQ) po jednom roce léčby



× Celkem: při efektu 2-5 let

.. první dávka se vždy podává za přítomnosti lékaře !

SLIT: DÁVKOVÁNÍ (ACARIZAX)



× Období: celoročně

.. evaluace (dotazník CSMS měsíční + RQLQ) před/při zahájení léčby

.. evaluace (dotazník CSMS měsíční + RQLQ) po jednom roce léčby

1 tableta denně (jednotná síla 12 SQ-HDM)

× Celkem: při efektu 2-5 let

.. první dávka se vždy podává za přítomnosti lékaře !

SLIT TBL.: PŘERUŠENÍ APLIKACE

Při přerušeni aplikace:

- > **přerušeni do 1 týdne:**
 - > pokračuj další tabletou „beze změny“
- > **přerušeni nad 1 nebo 2 týdny:**
 - > konzultuj svého alergologa „sám nepokračuj“