

Praktické aspekty alergenové imunoterapie tabletovou vakcínou (Oralair, Grazax)

SLIT TBL.: APLIKACE (JEDNOTLIVÁ DÁVKA)



Vložit tabletu do úst,
za zuby a pod jazyk.

Tabletu nechat rozplynout do
slin (nepolykat).

Po rozplynutí nechat sliny s vakcínou pod
jazykem ještě min. 2 minuty.

Pak polknout.

Přípravek aplikovat denně (nejlépe ve stejnou dobu - „rutina“).
Je třeba mít čistou ústní sliznici (prázdná ústa, nejíst a nepít
ještě min. 5 minut před/po aplikaci).

SLIT TBL.: APLIKACE (SKLADOVÁNÍ)

- **Nejsou vyžadovány zvláštní podmínky pro uchovávání !!**

.. nicméně: chraňte před mrazem a ponechteje mimo dosah a dohled dětí.

- **Respektuj datum expirace na blistru (krabičce).**
.. obvykle lze použít event. zbylé tablety i pro další sezonu.

SLIT TBL.: RIZIKA – NEŽ. REAKCE

- **Obvyklé**

- **orální syndrom** .. svědění či jiné dráždění až otok v ústech, na rtech či hrdle, orofaryngeální dyskomfort



Tyto nežádoucí reakce jsou typicky jen
mírné a na počátku léčby, v čase
spontánně ustupují a nejsou tak obvykle
důvodem k přerušení SLIT.

- **Méně obvyklé**

- dyspeptické potíže .. nevolnost, regurgitace, pálení žáhy, zvracení, průjem, břišní dyskomfort
- projevy rýmy či dráždění očí po podání, zhoršení astmatu
- celkové kožní reakce (kopřivka, angioedém)

- **Vzácné** – anafylaxe (šoková reakce, jiné závažné reakce)

SLIT TBL.: POSTUP – NEŽ. REAKCE

Při nežádoucích reakcích:

1. **nepodávej další dávku, pokud nežádoucí reakce trvá** (aplikuj další dávku až den po skončení reakce)
2. **další dávku podej event. sníženou** („na polovinu“, resp. podle konzultace s lékařem)
3. **užij, je-li potřeba, lék potlačující nežádoucí reakci** (antihistaminikum, event. oční, nosní či inhalační lék, event. léky tzv. pohotovostního setu /tbl. kortikoid, adrenalin/). **V případě těžší reakce vyhledej lékařskou pomoc** (v případě anafylaktické - šokové reakce volej ihned RZP).
4. **při nečekaných nežádoucích reakcích** (mimo „obvyklé“ orální projevy) **informuj svého alergologa**

SLIT TBL.: RIZIKA - PREVENCE

Zastavení aplikace

- **nastanou-li kontraindikace** .. nejčastěji:

- autoimunity /revm.onem., celiakie/ a malignity
- chronické onemocnění ústní dutiny
- obtížně kontrolovatelné astma

- **při non-compliance pacienta**

- **není –li dosaženo léčebného efektu**

- **po anafylaktické (šokové) reakci, resp. i po jiné opakované závažné nežádoucí reakci**

SLIT TBL.: RIZIKA - PREVENCE

Přerušeni aplikace

- **Záněty a poškození ústní sliznice** (infekce /moučivka/, afty, stomatologické zákroky, vypadnutí /mléčného/ zubu)
 - po dobu trvání, resp. do zhojení rány
- **Poruchy polykání a bolesti na hrudi**
 - dle posouzení alergologem
- **Při nežádoucích příznacích léčby obecně**
 - po dobu trvání, resp. dle posouzení alergologem
- **Horečka a akutní infekce**
 - po dobu trvání akutní fáze infekce
- **Exacerbace astmatu**
 - po dobu trvání zhoršení astmatu

SLIT TBL.: RIZIKA - PREVENCE

- **Informovat lékaře:**
 - **Při delším přerušeni léčby (nad týden až dva)**
 - **Při nečekaných nežádoucích reakcích léčby**
 - Při poruchách polykání a bolesti na hrudi
 - Při závažné změně zdravotního stavu (nové onemocnění)
 - Při zhoršení základního alergického onemocnění
 - Při zahájení léčby beta blokátory (antihypertenziva)
 - Při těhotenství
- **Dbej na dostatečnou zásobu léku.**
 - včas si zajisti nový recept.

SLIT: DÁVKOVÁNÍ (GRAZAX)



- ✗ **Období:** (4)-6 měsíců do konce sezony
 - .. zahájení leden až únor
 - .. aplikace do konce sezony (cca konec července)

1 tableta denně (jednotná síla 75.000 SQ-T)

- ✗ **Celkem:** při efektu 3-5 let (sezon)
 - .. první předsezonní dávka se vždy podává za přítomnosti lékaře ! → kontaktuj včas (leden) lékaře k domluvě termínu
 - je vhodné přijít již vybaven lékem (alespoň 1 tabletou)

SLIT: DÁVKOVÁNÍ (ORALAIR)



- ✗ **Období:** (4)-6 měsíců do konce sezony
 - .. zahájení leden až únor
 - .. aplikace do konce sezony (cca konec července)



- ✗ **Celkem:** při efektu 3-5 let (sezon)
 - .. první předsezonní dávka se vždy podává za přítomnosti lékaře !
 - kontaktuj včas (leden) lékaře k domluvě termínu
 - je vhodné přijít již vybaven lékem (iniciálním balením, resp. tabletou 100IR)

SLIT TBL.: PŘERUŠENÍ APLIKACE

Při přerušeni aplikace:

- **přerušeni do 1 týdne:**
 - pokračuj další tabletou „beze změny“
- **přerušeni nad 1 nebo 2 týdny:**
 - konzultuj svého alergologa „sám nepokračuj“